

GUIA DE PROCEDIMIENTO DEL USO DE FLUORESCEÍNA

DESCRIPCIÓN

Permite visualizar mejor lesiones de la córnea y conjuntiva.

PERSONA RESPONSABLE

Médico oftalmólogo

INDICACIONES

Todo paciente que acude a la consulta oftalmológica de emergencia con problema en la córnea y/o conjuntiva

EQUIPO

- Tiras de fluoresceína estéril ó frasco gotero de fluoresceína.
- Lámpara de hendidura con filtro azul (luz de cobalto).
- Frasco de proparacaína al 0.5%.
- Oftalmoscopio con filtro azul.

PROCEDIMIENTO

- 1) Se instila 1 gota de proparacaína al 0.5% en una tira de fluoresceína y esto se coloca en el ojo del paciente ó se coloca 1 gota del anestésico y luego 1 gota de la fluoresceína del frasco gotero.
- 2) Se acomoda al paciente en la lámpara de hendidura y con el filtro azul se observa si se tiñe la córnea y/o conjuntiva.
- 3) En caso de pacientes poco colaboradores sobre todo niños pequeños la visualización se hace con el filtro azul del oftalmoscopio.
- 4) Con esta tinción se observa:
 - Desepitelización de la córnea.
 - Ulceras corneales.
 - Laceraciones de conjuntiva.
 - Seidel: salida del humor acuoso a través de alguna solución de continuidad en la córnea
- 5) Al último se procede a la limpieza del ojo examinado con una torunda de algodón.

